



U G C N
uiergezondheidscentrum nederland

Postbus 2030
7420 AA Deventer
Nederland
www.ugcn.nl

Bedrijfsbehandelplan klinische mastitis

Veehouder

Behandeling (neem eerst een melkmonster)

Wachttijden in dagen* Z.O.Z.

Milde mastitis
Vlokje in melk

Melk

Vlees


Zieke koe met mastitis
Koorts

Ernstig zieke koe met mastitis
Sloom, hoge koorts

Bel uw dierenarts

Datum

Lees aandachtig de achterzijde voor meer informatie



Verschijselen

Milde mastitis

- Zichtbaar afwijkende melk (vlokken)
- Kwartier soms afwijkend
- Geen koorts of lichte temperatuurverhoging (minder dan 40°C)
- Koe eet meestal normaal, is niet algemeen ziek
- Soms lichte afname in melkproductie

Zieke koe met mastitis

- Zichtbaar afwijkende melk
- Kwartier afwijkend/hard
- Koorts
- Onvoldoende eetlust
- Koe is lusteloos
- Afname melkproductie

Ernstig zieke koe met mastitis

- Koe is zeer sloom
- Koorts (meer dan 40°C)
- Koe is koud
- Koe eet niets meer
- Ernstige afname melkproductie/geen melk
- Sterk afwijkende (soms waterige) melk

Behandel tips

- Trek een kwartier met mastitis regelmatig uit.
- Neem altijd een melkmonster voordat u antibiotica toedient.
- Melk de koe helemaal uit voor u een injector inbrengt.
- Voor inbrengen injector een desinfectiedoekje gebruiken, erna een tepeldip gebruiken.

Diergeneesmiddel tips

- Maak de behandeling helemaal af, ook als de mastitis eerder genezen lijkt.
- Verander pas van diergeneesmiddel na overleg met uw dierenarts.
- Schakel bij twijfel altijd uw dierenarts in.

Algemene tips

- Neem van een koe met mastitis altijd de temperatuur op.
- Merk de koe duidelijk.
- Noteer de benodigde gegevens in uw dierzieke-administratie.